

NOMBRE COMERCIAL
COMPOSICIÓN % P/V

BROADACRE ZM

Zinc (Zn) 36,0 %

Manganeso (Mn) 25,0 %

Suspensión Concentrada (SC)

Fertilizante

Agrichem Do Brasil.

Se considera no tóxico.

No corresponde.

12,5 L.

FORMULACIÓN
GRUPO QUÍMICO
FABRICANTE/FORMULADOR
TOXICIDAD
REGISTRO SAG
PRESENTACION COMERCIAL

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Fertilizante líquido floable, con alta concentración de Zinc y Manganeso, para aplicaciones al suelo, foliar, tratamiento de semillas y fertirriego.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS (L/há)	OBSERVACIONES
FRUTALES		
Palto	1,5 a 3,0	Aplicar desde inicio de brotación de primavera y otoño, aplicar mensualmente si es necesario, usar dosis máxima en caso de deficiencia severa.
Cítricos (Limón, Naranja, Mandarino)		
Durazno, Nectarín, Cerezo, Ciruelo, Damasco	1,5 a 3,0	Aplicar desde inicios de brotación, repetir 2 a 3 veces en la temporada de crecimiento, se debe tener precaución en variedades sensibles a toxicidad por zinc usando dosis mínima y no más de 2 aplicaciones.
Frutilla, Frambuesa, Arándano, Cranberries, Murtilla, Zarparrilla	0,75 a 2,0	Aplicar desde inicio de crecimiento vegetativo y pre floración.
Nogales	1,75 a 2,5	Aplicar a inicio de flores pistiladas, repetir cada 15 días.
Uva de mesa y Vinífera	2,0 a 2,5	Aplicar en brote de 20 y 40 cm, repetir pre floración.
Avellano Europeo	0,75 a 1,5	Aplicar a inicios del crecimiento vegetativo, repetir cada 15 días.
Kiwi	0,75 a 1,5	Aplicar a inicios del crecimiento vegetativo, repetir cada 15 días.
Manzano, Peral	1,75 – 2,5	Aplicar en puntas verdes, repetir con fruto cuajado, a los 15 días.
Olivos	1,75 – 2,5	Aplicar a inicios del crecimiento vegetativo, repetir a los 15 días.
HORTALIZAS		
Lechuga, Apio	0,75 a 2,0	Aplicar 7 días después de la emergencia/trasplante. Repetir cada 15 días.
Tomate, Pimentón		Comenzar aplicaciones 7 días después del trasplante. Repetir cada 14 días.
Coliflor, Brócoli, Repollo		Aplicar 10 días después de la emergencia/trasplante. Repetir cada 15 días.
Cebolla, Ajo, Zanahoria		Aplicar 7 días después de la emergencia/trasplante. Repetir cada 15 días.
Sandía, Melón, Zapallo, Zapallo italiano		A partir de 10 días después de trasplante. Repetir quincenalmente si es necesario.
CULTIVOS		
Poroto, Soja, Lenteja, Garbanzo, Habas y Arvejas	0,75 a 2,0	Aplicar desde brotes de 10 cm, repetir cada 15 días.
Papa		Con brote en crecimiento activo cada 15 días
Maíz		Aplicar desde V6 en adelante.
Trigo, Arroz, Avena		Aplicar desde inicio de macolla, repetir cada 15 días.

VIVEROS	DOSIS (L/há)	OBSERVACIONES
Viveros (Hortícolas, flores, frutícolas y forestales)	0,2 a 0,4	Durante el desarrollo y formación de las plantas. Repetir a intervalos de 15 días.

CONSIDERACIONES DE USO Y FORMA DE APLICACIÓN

- Agite bien el envase antes de utilizar.
- Colocar agua en el estanque hasta la mitad.
- Agregue la cantidad necesaria de **Broadacre ZM**, previamente diluida en forma homogénea y luego completar con agua, manteniendo la agitación hasta el término de la aplicación.
- Prepare la solución con **Broadacre ZM** el mismo día de la aplicación.
- No almacene **Broadacre ZM** diluido en agua.
- Para mayor información sobre las dosis para tratamiento de semillas y fertirriego consultar a nuestro Departamento Técnico.
- Producto apto para aplicaciones aéreas y con máquina electrostática.