

NOMBRE COMERCIAL	KEMAZON
INGREDIENTE ACTIVO	Dicloruro de Paraquat
GRUPO QUÍMICO	Bipiridilios
CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN	27,6% p/v SL (Concentrado Soluble)
MODO DE ACCIÓN	De contacto total, no selectivo
FABRICANTE	PILARQUIM (Shangai) Co. Ltd
TOXICIDAD	Grupo II (NOCIVO)
REGISTRO SAG	3.663
PRESENTACIONES COMERCIALES	20 L

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

KEMAZON, es un herbicida de contacto total, no selectivo que controla todo tipo de vegetación, tanto de gramíneas como dicotiledóneas, en huertos de frutales de carozo, pomáceo y cítrico, como también en frutales menores. Asimismo se puede utilizar en forma localizada en viñas, parronales, olivos, remolacha, esparragueras, ornamentales y forestales (sólo sobre malezas). Utilícese como herbicida total en terrenos agrícolas no cultivados (Bordes de camino, Canales), en regeneración de empastadas y control de malezas acuáticas. También como desecante en algunos cultivos.

• **CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO**

Cultivo	Malezas	Dosis (l/ha)	Observaciones
Almendro, Damasco, Cerezo, Ciruelo, Durazno, Nectarino, Manzano, Membrillo, Nogal, Olivo, Palto, Peral, Vid, Kiwi, Limonero, Lima, Naranja, Pomelo, Mandarino, Tangerina, Tangelo, Níspero, Caqui, Frambuesa, Arándano, Mora, Zarparrilla.	Malezas gramíneas anuales: Ballica, Avenilla, Poa o Pijillo, Cola de zorro, Hualcacho, Pata de gallina, Pega-pega, Pasto del perro, Bromo, Tembladera, Tembladerilla, Vulpia, Cola de ratón.	2.0-4.0	Aplicar con maleza nueva y en activo crecimiento. Se puede mezclar con herbicidas residuales.
Cero y Mínima labranza: Trigo, Avena, Cebada, Centeno, Triticale, Maíz, Arroz, Arveja, Haba, Frejol, Garbanzo, Lenteja, Lupino, Raps, Espárrago, Papa, Remolacha, Lechuga, Espinaca, Sandía, Melón, Zapallo, Zanahoria. También en frutales (Almendro, Damasco, Cerezo, Ciruelo, Durazno, Nectarino, Manzano, Membrillo, Nogal, Olivo, Palto, Pera, Vid, Kiwi, Limonero, Lima, Naranja, Pomelo, Mandarino, Tangerina, Tangelo, Níspero), frutales menores (Caqui, Frambuesa, Arándano, Mora, Zarparrilla), y cultivos ornamentales (Rosales, Clavel, Clavelon, Hortensia, Crisantemo, Gladiolo, Narciso, Iris, Tulipán, Liliun, Ficus, y Alstroemeria).	Malezas gramíneas perennes: Chépica o Pasto quila, Pasto cebolla, Maicillo, Chépica gigante, Pasto bermuda. Malezas hoja ancha anuales: Bledo, Amor seco, Bolsita del pastor, Cardo, Romanza, Chamico, Hierba cana, Senecio, Yuyo, Manzanilla, Ortiga, Quinguilla, Rábano, Sanguinaria, Verdolaga, Vinagrillo.	1.5-3.0	Aplicar con maleza emergida al momento de la siembra. Cultivos ornamentales se refiere a que por forma y distancia de plantación, es posible hacer aplicaciones basales dirigidas al piso y usando protectores de boquillas de manera de localizar el producto, como por ejemplo en el caso de rosales, arbustos y matorrales usados como especies ornamentales en parques y jardines.
Maíz, Espárrago, Papa, Remolacha, Lechuga, Espinaca, Sandía, Melón, Zapallo, Zanahoria.	Otras malezas perennes: Falso té, Achicoria, Siete venas, Hierba azul, Galega, Junquillo,	1.5-3.0	Aplicación selectiva entre hileras, evitando mojar el cultivo. Aplicar en maíz cuando tenga unos 40 cm de altura.
Alfalfa	Chufa o Coquillo, Correhuela, Malva, Zaramora.	1.5-3.0	Aplicar en latencia invernal o inmediatamente después de un corte, desde el segundo año del cultivo en adelante.
Praderas		2.0-2.5	Aplicación de limpieza y renovación de praderas.
Terrenos agrícolas no cultivados (Bordes de caminos, Canales)		3.0-4.0	Aplicar cubriendo muy bien la maleza. En limpieza de canales aplicar sobre los bordes en dirección contraria a la corriente de agua.
Raps, Maíz, Trigo, Papa, Trébol. Desecante Foliar		1.5-2.5	Como desecante foliar, para facilitar la cosecha se recomienda aplicar unas 2 a 3 semanas antes y con humedad de grano hasta un 35%. Máximo 1 aplicación por temporada
Remolacha		2.0-4.0	Aplicar selectivamente sobre la maleza entre hileras, evitando mojar el cultivo.

PRECAUCIONES

- Se recomienda diluir **KEMAZON** de preferencia con un volumen de agua entre 200 y 600 L/ha.
- Aplica dosis menor con malezas en sus primeros estados de desarrollo o con baja infestación y dosis mayor con malezas mayor tamaño y alta infestación.
- No utilizar **KEMAZON** en maleza seca o de excesivo crecimiento.
- Como herbicida: realizar un máximo de 10 aplicaciones por temporada. El intervalo de aplicación es variable, según rebrote de las malezas perennes o una nueva generación de anuales.
- Como desecante foliar: máximo 1 aplicación por temporada.
- Retirar del terreno todos los artículos (trapos, huaipes, etc.) que hayan quedado embebidos con el producto y disponer de ellos de acuerdo con lo establecido por la autoridad competente.
- Al momento de realizar la aplicación deberán disponerse de letreros de advertencia indicando día y hora del tratamiento y el tiempo de reingreso al área tratada. Sólo los aplicadores pueden estar en el lugar o próximos a éste, al momento de realizar la aplicación.

Preparación de la mezcla: Lavar profusamente el estanque del equipo aplicador. Llenar el estanque hasta la mitad con agua y agregar la dosis recomendada de **KEMAZON** y completar hasta el volumen de agua deseado, manteniendo agitación constante

Incompatibilidad: **KEMAZON** es incompatible con materiales alcalinos y surfactantes aniónicos.

Fitotoxicidad: Fitotóxico para todas las plantas con cuyo follaje entra en contacto.

Tiempo de Reingreso al área tratada (personas y animales): Personas: Impedir durante 24 horas el ingreso al sector tratado sin equipo de protección. Animales: En el caso de animales esperar 21 días para permitir el ingreso.

Periodo de Carencia: Como desecante foliar 21 días. Para el resto de los cultivos y tratamientos no corresponde debido a la naturaleza de la aplicación.